

稲作緊急特報

平成30年 8月10日
黒東地域農業技術者協議会

梅雨明け以降、高温・少雨状態が続いており、今後も9月上旬までの約1か月間は晴天が続き、高温状態が継続すると予想されています。

このため、「てんたかく」や「ミルキークイーン」などの刈取りは例年より早くなることを見込まれます。さらに、刈遅れによる「胴割粒」の発生が懸念されることから、籾黄化率80%からの収穫作業が始められるよう、コンバインや乾燥機などの清掃を速やかに始めてください。

また、収穫5日前までは「間断かん水」を続けるとともに、早期落水の防止で、胴割粒発生防止に努めてください。

1. 「てんたかく」及び「ミルキークイーン」の適期刈取り（予想）

籾黄化率80%（高温登熟時の基準）で、刈取りを始めましょう。

品 種 名	出 穂 期	刈取始め
てんたかく	7月19日	8月20日頃
	7月22日	8月24日頃
ミルキークイーン	7月22日	8月25日頃
	7月25日	8月28日頃

※コシヒカリの刈取開始時期は、9月3日頃と見込まれます。




図 籾黄化率 80%

2. 水管理について

○収穫5日前までの水管理・・・**間断かん水**

足跡に水がなくなったら、速やかに入水する。

※かけ流しは、農業用水の有効活用を図るため、絶対にしないでください。

◎フェーンなどによる高温が予想される場合は、事前に入水しましょう。