

# 早生防除特報

平成30年 7月13日  
黒東地域農業技術者協議会

## ～斑点米カメムシ類の発生注意報発令中！～

7月6日に注意報が発令されました。

また、みな穂農協管内の雑草地で、アカスジカスミカメ（右写真参照）などの斑点米カメムシ類が多く、多くの地点で確認されています。

「てんたかく」などの早生品種の防除を徹底し、斑点米の発生防止に努めましょう。



▷アカスジカスミカメ

## ◎ てんたかく（早生）の基本防除

防除月日		農薬名	10a当たり散布量
走り穂 (1回目)	7月19日～ 21日頃	トレボン粉剤DL (カメムシ類、ウンカ類)	3kg
穂揃期 (2回目)	7月26日～ 28日頃	ラブサイドキラップ粉剤DL (いもち病、カメムシ類、ウンカ類)	4kg
傾穂期 (2回目防除 から7日後)	8月 2日～ 4日頃	スタークル粉剤DL (カメムシ類、ウンカ類)	3kg

※防除効果を高めるため、散布の間隔は1週間以内としましょう。

### ▷散布時の留意点

- ・周辺雑草地や畦畔などにも、薬剤がかかるように散布してください。
- ・使用基準を守るとともに、周辺の作物への農薬飛散の防止に努めてください。
- ・大麦跡やエンバクは早めにすき込み、雑草対策の徹底を図りましょう。

### 【参考】無人ヘリコプターによる散布予定時期（早生）と農薬名

防除時期	農薬名	10a当たり散布量
7月19日～21日頃	トレボンエアー	0.8リットル
7月26日～28日頃	【朝日町】 ・ラブサイドキラップフロアブル	0.8リットル
	【入善町】 ・ラブサイドフロアブル	0.8リットル
	・キラップフロアブル	0.8リットル
8月 2日～ 4日頃	スタークル液剤10	0.8リットル

※コシヒカリの防除時期は、後日折込みチラシなどで別途ご案内します。