

富富富 特報

「胴割米」の発生を防ぐため、適切な水管理や適期の刈取り、適正な乾燥調製を行い、高品質な「富富富」に仕上げましょう！



1. 刈取りまでの水管理

～落水を急がない！～

- ・刈取りの5～7日前まで間断かん水を行い、稲体の活力を維持し胴割米の発生を防ぎましょう。ただし、フェーン現象が予想される場合は、事前に入水しましょう。

2. 適期刈取

～籾黄化率を確認して、適期に刈取る！～

- ・青米や胴割米の混入を防ぐため、籾黄化率 80%を目安に刈取りを始め、籾黄化率 90%までに刈り終えましょう。


※コシヒカリに比べ、籾の黄化にバラツキが出やすく、また、急激に黄化するため、注意が必要です。

籾黄化率 90%を超えると、胴割米が急激に多くなるので注意しましょう。

【刈取時期の目安】※籾黄化率 80%

出穂期	刈取適期
8月1日	9月11日～ 13日頃
8月5日	9月16日～ 18日頃
8月9日	9月21日～ 23日頃

●：黄化
○：黄化直前
○：緑色



刈取適期の穂における籾黄化状況
※矢印で示す点線内の籾が黄化した時
が籾黄化率 80%で刈取適期

※ライスセンターへの籾の持ち込み日については、事前にお問い合わせください。

3. 乾燥・調製

～「過乾燥」による胴割米の発生防止～

- ・胴割米の発生を防ぐため乾燥速度は毎時 0.8%以下を基本とし、ゆっくりと乾燥しましょう。
- ・初期の籾水分が高い場合（25%以上）や低い場合（20%以下）は、二段乾燥や送風温度を下げるなど、丁寧な乾燥に努めてください。
- ・青米の混入が多いので、水分の戻りに注意して停止水分を設定しましょう。

【乾燥機停止水分の目安】

100粒中の青米粒数	0～5粒	6～10粒	11粒以上
乾燥機停止後の水分変化	乾く（-0.5%）	変わらない	もどる（+0.5%以上）

- ・玄米水分は 14.5～15.0%に仕上げましょう。玄米水分が 17%以下になったら、手動水分計でこまめに測定し、過乾燥米の発生を防止しましょう。
- ※フレコン出荷の場合は 14.0～14.5%に仕上げてください。
- ・1.9mmのふるい目を必ず使用し、選別の徹底で未熟粒の混入を防ぎましょう。
- ・色彩選別機を整備している経営体は積極的に活用し、品質の向上に努めましょう。

出荷前に、化学合成農薬の成分数（12以内）を確認し、栽培記録簿を提出してください。令和7年産の「富富富」の作付拡大をお願いします。